

Ueber
Ueberanstrengung des Herzens
besonders im Militär.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Universitäts-Professors

Dr. Fr. Seitz


der medicinischen Facultät in München vorgelegt

von

Franz Xaver Mayer

aus Mauern,

Einjähriger freiwilliger Arzt im I. Inf.-Reg. (König).



München, 1877.

Königliche Hof- & Universitäts-Buchdruckerei
von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber

Ueberanstrengung des Herzens

besonders im Militär.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Universitäts-Professors

Dr. Fr. Seitz

der medicinischen Facultät in München vorgelegt

von

Franz Xaver Mayer

aus Mauern,

Einjähriger freiwilliger Arzt im I. Inf.-Reg. (König).

München, 1877.

Königliche Hof- & Universitäts-Buchdruckerei

von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Von allen Muskeln am ganzen Körper kann man drei bezeichnen, die während des Lebens des Organismus durch ihre Thätigkeit vor allen übrigen hervorrangen; ich meine den Zwerchfells-, den Ciliar- und den Herzmuskel. Was den Letzteren betrifft, so wissen wir, daß kein Organ länger mehr functionirt, wenn mit dem Aufhören der Triebkraft des Herzens demselben kein Blut mehr zugeführt wird; mit dem Aufheben der Herzthätigkeit muß auch der Organismus aufhören zu existiren. Wenn wir die Arbeit des Herzens ausdrücken wollen in Zahlen, so ergibt sich etwa folgendes: Nach Vierordt wirft eine Systole 172 Cub.-Cent. Blut aus, nach anderen Autoren 188 Cub.-Cent.; die Mitte beider Angaben nemlich 180 Cub. - Cent. als das Richtigere angenommen, muß das linke Herz in einem Tage, da der Blutdruck in der Aorta 3,21 Meter beträgt — bei einer Pulszahl von 75 in der Minute — 64,800 Kilo einen Meter hoch in die Aorta werfen. In der Pulmonalarterie ist der Druck drei Mal geringer; demnach würde die Arbeit des rechten Herzens an einem Tage 21,600 Kilogramm betragen, und das ganze Herz ist im Stande 86,400 Kilo Blut in einem Tage einen Meter hoch zu heben. Wenn wir die Anzahl der Systolen berechnen wollten, die das Herz während eines Menschenalters zu vollbringen hat, so ergibt sich in der Minute 75 angenommen während eines Alters von 30 Jahren eine Anzahl von etwa 1182 Millionen, in einem Alter von 50 Jahren eine solche von 881 und in einem Alter von 60 Jahren eine Anzahl von 2365 Millionen Herzschlägen.

Zu dieser Thätigkeit des Herzens ohne Stillstand bemerkte Corvisart¹⁾: „Betrachtet man den Embryo, so entdeckt man kaum dessen erste Anlage, als man auch schon ein schlagendes Herzchen, das punctum saliens des Harvey sieht. Vom Entstehen dieses punctum saliens an und gewiss auch schon früher, bis zum Tode durch das hohe Alter, welches wir zu 90 Jahren annehmen wollen, wer kann die Millionen von Pulsationen zählen, die das Herz ohne Stillstand macht? Ihre Zahl beläuft sich auf 2858 Millionen und 240 Tausende, wenn wir auch nur vom Augenblicke der Geburt an und nur 60 Schläge auf die Minute rechnen. Möchte das Herz diese ungeheure Reihe von Pulsationen wenigstens vollenden, ohne dass etwas dieselbe zu stören strebte, ohne dass Hindernisse es zu öfteren und starken Anstrengungen zwängen“!

Wenn wir angeben sollen, wozu diese enorme Leistung des Herzens verwendet wird, so lehrt die Physiologie, dass die ganze mechanische Kraft der Herzbewegung bei der Ueberwindung der Gefäßwiderstände zurückverwandelt wird in Wärme. Von den 2700 Wärmeeinheiten, die durch den thierischen Stoffwechsel producirt werden nach Helmholtz's Berechnung, darf man annehmen, dass 90/100 der thierischen Wärme aus der Arbeit des Herzens allein stammen. Ich habe diese Thatfachen deshalb erwähnt, um im Folgenden zu zeigen, welch' tiefgreifende Veränderungen in der Oekonomie des animalen Lebens hervorgerufen werden müssen, sowohl wenn das Herz einerseits durch übermässige Anstrengungen gezwungen ist, mehr zu leisten, als auch anderseits, wenn es durch Abnahme der Triebkraft und allmähliche Erlahmung nicht mehr leisten kann, was es leisten soll.

¹⁾ Corvisart: Versuch über die Krankheiten und organischen Verletzungen des Herzens. Berlin 1842.

Die Mehrzahl der Krankheitsveränderungen des Herzens, wie sie im Folgenden besprochen werden sollen, kommen nach Friedreich²⁾ vor bei Männern, welche der arbeitenden Classe angehören. Die Urfachen im Allgemeinen sind: übermäßige körperliche Anstrengungen andauernd psychische Erregungen und Leidenschaften, Uebermaß im Genuß geistiger Getränke und dadurch veranlafte, anhaltende Beschleunigung der Herzthätigkeit und Steigerung der Nutrition. Da aber Handwerke, welche großen Kraftaufwand fordern, wie das der Schmiede, Kohlengräber und Werftarbeiter einen gekräftigten Organismus voraussetzen, da ferner diese Kraft nur dem Jünglings- und mittleren Mannesalter innewohnt, so folgt, daß diese Krankheitserrscheinungen meistens im Alter von 20—40 Jahren auftreten. In diese Zeit fällt aber der Soldatenstand, und die Statistik weist nach, daß derselbe absolut und relativ die meisten Herzerkrankungen und die höchste Zahl der Mortalitätsziffer an Circulationskrankheiten bietet. So sagt in Bezug auf die englische Armee Arthur Myers³⁾: „Weitaus der größte Theil der herzkranken Soldaten wird als Invalide erklärt und heimgeschickt und erscheint also später, falls er an seinem Herzleiden stirbt, in den civilen Sterberegistern; dadurch wird wieder die Zahl der Herzkranken unter den Soldaten herabgesetzt, unter den Civillisten erhöht.

Die Sterblichkeit der Herzkranken nimmt in der civilen Bevölkerung mit Zunahme der Jahre bedeutend zu, die beträchtliche Mehrheit der Soldaten steht aber unter dem 30. Jahre. Obwohl nun so alle Gelegenheiten gegeben sind, daß die Mehrzahl der Herzkranken nicht auf Rech-

²⁾ Friedreich: Krankheiten des Herzens. Erlangen 1867.

³⁾ Arthur Myers: Ueber die Häufigkeit und die Urfachen der Herzerkrankheiten bei den Soldaten. London 1870.

nung der Armee, sondern der civilen Bevölkerung fallen sollte, so hat die Armee 0,9% Todesfälle an Krankheiten der Circulationsorgane bei einer allgemeinen Mortalität von 8,36%, während die Civillisten eine höhere Mortalität haben, im Allgemeinen nemlich 11% und doch eine geringere an Circulationsorganen, nemlich 0,77%. Und ein weiterer Vergleich zeigt nun, daß die Armee auch gegenüber anderen Volksclaffen, die vermuthlich ähnliche Verhältnisse zeigen sollten, im Nachtheil ist, relativ mehr Herzkrankte aufweist. In den Jahren 1860—65 wurden nemlich wegen Circulationskrankheiten von der Armee Invalide 5,26 pro mille starben 0,9, von der Marine 3,44 pro mille starben 0,66. Eine Vergleichung der Garde zu Fuß und der Londoner Polizei ergab, daß an Herzkranken u. f. w. von den Fußgarden Invalide wurden 3,2%, starben 0,8%, von der Londoner Polizei „ „ 1,37%, „ 0,29%. Auch die Handelsflotte verliert weniger Leute durch den Tod an Herz- und Gefäßkrankheiten als die Armee, nemlich 0,35 pro mille.

Diese höchst überraschenden Thatfachen, wie sie die Statistik über die Erkrankungen der Circulationsorgane in der Armee uns vorführt, muß nothwendigerweise ihre Ursachen und Gründe haben. Es sind auch hiefür bestimmte ätiologische Momente ermittelt worden, die weiter unten angeführt werden sollen.

Nach diesen Bemerkungen möchte ich die Reihenfolge der Störungen im Organismus und der Function des Herzens bedingt durch Ueberanstrengung desselben beginnen mit der Ueberreizung des Herzens — dem Erethismus cordis. Bei jeder körperlichen Anstrengung werden die Oxydationsproceß erhöht und die Bedingungen der Zersetzung — Sauerstoff und organische Nahrungsstoffe — müssen in reichlicherem Maße zugeführt werden. Mit dieser Erhöhung der Oxydationsvorgänge muß auch eine Erhöhung der

Athem- und Herzbewegungen eintreten. Der Träger des oxydirbaren Materials ist aber das Blut.

Da nun nach der Physiologie die Blutvertheilung eines Organes sich nach dessen Thätigkeit richtet — die Function eines Organs also dessen Blutmenge influenzirt — so wird, wenn diese erhöhte Thätigkeit länger fortgesetzt wird, dem Herzen eine grössere Quantität Blut zugetrieben. Durch diese Blutfülle sowie durch die gesteigerte Herzaction wird der Blutdruck erhöht. Auf diesen Vorgang reagiren die einzelnen Individuen auf verschiedene Weise. Der Eine verspürt bloß Saufen im Kopf, und dabei sind geringe Grade von Fluxion vorhanden; bei dem Andern treten active Hyperämie des Gehirns und der Lungen auf. Doch nicht allein nach diesen Organen, sondern auch nach andern Parthien des Körpers kommen Fluxionen vor.

So berichtet Stabsarzt Thurn⁴⁾: Wir beobachten in Folge anstrengender Märsche besonders in der Hitze Blutharnen, Harnzwang; gewisse Symptome wie: Ameisenkriechen und Rückenschmerzen sind auf Fluxionen nach dem Rückenmark zurückzuführen, das auf dieselbe Weise afficirt wird, wie das Gehirn. Diese Fluxionen treten hauptsächlich auf an heißen Tagen, jedoch bei andauernden und forcirten Märschen nicht allzu selten auch bei niederer und mittlerer Temperatur. Bei einer Atmosphäre, welche der Eigenwärme des Körpers sich nähert, tritt neben der durch mechanische Arbeit mächtig erregten Herzthätigkeit noch ein anderes krankmachendes Moment hinzu. Da die Wärmeabgabe nach Außen behindert ist, weil ja die Temperatur der Luft der Eigenwärme des Körpers nahe kommt, so wirkt diese letztere störend auf die Functionen des centralen Nervensystems und führt zu directer Lähm-

⁴⁾ W. Thurn: die Marschkrankheiten. Berlin 1872 Seite 10.

ung der Muskeln. Zur activen Hyperämie des Gehirns tritt noch eine passive durch behinderten Venenabfluß. In Folge dessen, sowie auch durch die bei Gehirnfluxionen eintretende Reizung der Hemmungscentren der Herzbewegung wird eine Herabsetzung der Herzthätigkeit stattfinden. Diese Ueberfüllung des Gehirns mit Blut und die verminderte Wärmeabgabe nach Außen machen sich geltend in Reizungserrscheinungen der sensiblen und motorischen Sphäre. Es treten Herzpalpitationen und Herzschmerz auf. Die Palpitationen sind heftig und häufig. Der Schmerz ist oft das erste Zeichen, das der Kranke beobachtet. In den Sinnesorganen: Empfindlichkeit gegen Licht und Geräusch, Flimmern vor den Augen, Saufen im Ohr, Verengung der Pupille; ferner psychische Störungen: Allgemeine Aufregung, Delirien, Schlaflosigkeit, Anfälle, die einer Tobsucht ähnlich sind, besonders bei Säugern. In der motorischen Sphäre: krampfhaftes Contracturen an den Muskeln der Extremitäten. Dabei ist die Respiration langsam, Puls träg und voll. Diese Krankheitserscheinungen können zwar in jedem schweren Handwerke vorkommen, bei übermäßiger Anstrengung, aber in den meisten Fällen treten sie doch unter dem Soldatenstande auf. Deshalb bemerkt auch Stabsarzt Thurn in der Einleitung seiner Marschkrankheiten: „Es versteht sich von selbst, daß überhaupt mechanische Arbeit Krankheitserscheinungen hervorbringen kann, welche den auf militärischen Märschen beobachteten gleich oder ähnlich sind; da sich bei Letzteren aber der Mensch in großer Anzahl durch unbedingten Gehorsam gezwungen, gewissen krankmachenden Potenzen aussetzt und es nicht in seinem Willen liegt, sich denselben nach Gutdünken zu entziehen bei den ersten Anzeichen von Unwohlsein, so ist klar, daß ganz besonders der Militärarzt in die Lage kommt, derartige Erscheinungen zu beobachten. Mit dieser Anschauung über-

einstimmend, gibt auch Da Costa⁵⁾ als Urfachen bei Ueberreizung des Herzens in 200 beobachteten Fällen folgendes an: „strenger Felddienst war in 34,5% der Fälle die am meisten falsbare Urfache. Einige dieser Kranken hatten zwar auch gastrische oder intestinale Beschwerden gehabt, die aber nicht von hartnäckigem oder activem Charakter gewesen waren. Der beständige und schwere Dienst auf der Piquetlinie oder während der militärischen Bewegungen angesichts des Feindes, pflegten die Herzsymptome zur Entwicklung zu bringen. Oder gering vorher wurden sie vermehrt und ausgesprochen nach forcierten Märschen, oder die Verschlimmerung trat ein während angestrengtem und aufregendem Fechten und Marschiren.“

In der medizinischen Tagesliteratur weniger, in den Specialwerken über Kriegsheilkunde findet sich ein Krankheitsphänomen näher beschrieben als „Sonnenstich oder Hitzschlag“. Diese Krankheitserscheinung gilt als der Ausdruck der durch Ansteigen der Körpertemperatur über 39,4° herbeigeführten Herzparalyse. Stromeyer⁶⁾ hat in seinem Werke: „Maximen der Kriegsheilkunst“ unter der Bezeichnung „acute Manie“ einige Fälle mit wenigen Worten aufgeführt, die als Infolationen schweren Grades mit größter Wahrscheinlichkeit zu betrachten sind. Von den englischen und französischen Militärärzten, namentlich aber von ersteren, ist in der von Horn'schen Vierteljahresschrift 1867 2. Band eine längere Abhandlung über die Infolation geliefert. Demnach tritt dieselbe auf bei erhöhter Körpertemperatur und behinderter Wärmeabgabe, durch Wasserverluste des Blutes in Folge profuser Schweisssecretion und Anhäufung von Kohlenäure in demselben, verdorbene In-

⁵⁾ Da Costa, Professor der pract. Medizin zu Philadelphia. the American Journal of the medical sciences for January 1871.

⁶⁾ Stromeyer, Maximen der Kriegsheilkunst. pag. 45.

spirationsluft bei langfamer und flacher Respiration und Depreffion des gefammten Nervenfyftems. Der Puls erreicht in manchen Fällen eine Höhe von 140—160 Schlägen; die Temperatur steigt bis 40 und darüber, die Zahl der Respirationszüge wird in manchen Fällen 48; dabei ist der Stuhl oft angehalten, bisweilen unwillkürlich; Urinfekretion ist in der Regel nicht vorhanden. Bei der Section findet man das Blut dunkelschwarz, hochgradige Hyperämie der Lungen; das linke Herz ist leer, das rechte mit den Venenstämmen ist mit Blut angefüllt; eine beträchtliche Blutstauung in den venösen sinus des Gehirns und der plexus choriodei.

Nach den Feldzügen von 1866 und 70 wandte sich die Aufmerksamkeit in besonders reger Weise der Gesundheitspflege auf Märschen zu und man bemühte sich die auf und im Gefolge von Märschen auftretenden Krankheiten zu analysiren, ihren Urfachen nachzuspüren und Mittel zu ihrer Abhaltung zu erfinden. Der Grund hiefür erklärte sich aus der Thatfache, daß die unerhört schnellen und andauernden Märsche der modernen Kriegsführung mit ihren enormen Truppenanhäufungen an die Leistungsfähigkeit der Mannschaft ganz außerordentliche Anforderungen stellten und so die Gefahren des Eintrittes von Krankheiten in ungewöhnlicher Weise sich häuften. „Das Correspondenzblatt⁷⁾ des niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege erklärt als die ausführlichste in dieser Beziehung die Arbeit von Stabsarzt Thurn. Als einen wesentlichen Factor für das Zustandekommen von Fluxionen und Hitzschlag betrachtet derselbe die directe Einwirkung von Sonnenstrahlen auf den Schädel und den oberen Theil des Rückenmarks. Da der Schädel

⁷⁾ Correspondenzblatt des niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Band 4. Nr. 4, 5 u. 6.

und die knöcherne Hülle des oberen Theiles des Rückenmarks als schlechte Wärmeleiter die Eigenschaft haben, sich intensiv und nachhaltig zu erhitzen, so lähmen sie die vasomotorischen Nerven. Störungen der vasomotorischen Nerven reagiren aber bei geringer Schädlichkeit mit Erweiterung. Da nun dazu noch die erhöhte Herzthätigkeit kommt, so ist um so leichter die Möglichkeit der Gehirnfluxionen gegeben. Das Aufsteigen der Temperatur im Körper über 40^0 , das an und für sich schon die Function des centralen Nervensystems zu beeinträchtigen scheint, bedingt durch erhöhte Oxydation einen rascheren Zerfall der Gewebe, schneller eintretende Ermüdung der vorzugsweise in Anspruch genommenen Muskeln; die lang dauernde verstärkte Herzthätigkeit führt vorzüglich zur Ermüdung auch dieses Muskels.“ Eine andere Ansicht über das Zustandekommen der Infolation ist gegeben in der deutschen militärärztlichen Zeitschrift ⁸⁾ von Dr. Jakubsch. Nach ihm ist der Herzschlag der Ausdruck einer durch Ansteigen der Körpertemperatur über $39,4$ herbeigeführten Herzparalyse. Diese Herzlähmung will er nicht als durch Innervationsstörung von den Centren aus bedingt sehen, sondern als Resultat jener Wärmestarre des Herzmuskels, welche Vallie und Obernier experimentell beim Infolationstode nachgewiesen haben, wobei sie eine Aufhebung der galvanischen Erregbarkeit des Herzens fanden. Mag nun mehr die eine oder die andere Ansicht der beiden Autoren als die richtigere gelten, immer gilt als das erschwerendste Moment beim Zustandekommen des Hitzschlages die anfangs gesteigerte Herzaction und die später eintretende Paralyse dieses Muskels.

Die nemlichen schädlichen Momente, die im Anfang nur eine Ueberreizung des Herzens bedingt haben, können

⁸⁾ Deutsche militär-ärztliche Zeitschrift 1873. Seite 465—496.

je nach dem Grade der Intensität, der kürzeren und längeren Zeit und der Art ihrer Einwirkung verschiedene Störungen im Organismus und Krankheitsformen zur Folge haben. Als nächsten Effekt einer länger dauernden Ueberanstrengung des Herzens käme in Betracht, die Verdickung feiner Wandungen und Ausweitung feiner Höhlen.

Das Herz muß, um den Umlauf des Blutes in einer geschlossenen Röhre zu ermöglichen, elastisch und contractil sein. Vermöge der Elastizität wird das Volumsverhältniß in den Herzhöhlen geändert, vermöge der Contractilität das dynamische Gleichgewicht im Stromlaufe geregelt; aber durch diese Eigenschaften des Herzens sind auch die Bedingungen der Hypertrophie und Dilatation gegeben, indem die Herzwand hypertrophirt, wenn seine Contractilität übermäßig gesteigert wird und seine Höhlen dilatirt werden, wenn die Anforderung an die elastische Kraft eine abnorme ist.

Die ätiologischen Momente, unter denen Herzhypertrophie zu Stande kommt, sind nach der pathologischen Anatomie verschiedene. Sie nennt vor Allem Ursachen, welche einen gewissen Reiz ausüben auf das Herz und seine Bewegungen, und rechnet unter diese Reize den übermäßigen Genuß von Spirituosen, Tabak, Cafe, psychische Affecte, längeren Kummer, Schreck und nervöse Reize. Der übermäßige Genuß von Tabak veranlaßt nach Macleau und Chevers Reizbarkeit des Herzens, Verdauungsbeschwerden und Muskelschwäche, aber bemerken die nemlichen Autoren: es ist gar kein Grund vorhanden, daß dieser Tabakmißbrauch irgend eine größere Rolle spiele. Von der Trunksucht behaupten Frenichs, Traube und Myers, daß sie einen schädlichen Einfluß ausübe auf das Herz und die Gefäße und die besonders bei jungen Leuten vorhandene Reizbarkeit des Herzens vermehre. Förster⁹⁾ gibt an, daß Herz-

⁹⁾ Förster, patholog. Anatomie, herausgegeben von Siebert. Seite 340.

palpitationen veranlaßt durch länger dauernde psychische Affecte, körperliche Anstrengungen, sexuelle Schwächungen Ursache sein können zu Herzhypertrophie. Ferner ist von Belang für die Bewegungen und Gröfse der Arbeit des Herzens die Menge des circulirenden Blutes. Allgemeine Pletthora kann durch Ueberfüllung der Gefäße einen vermehrten Druck im Gefäßsystem bedingen, der als Circulationshemmniss aufzufassen ist und durch vermehrte Herzaction überwunden werden muß. So sollen nach Niemeyer Leute, die sich einem schwelgerischen Leben ergeben, Weinreisende, die oft den ganzen Tag essen und trinken und so häufig in einem vorübergehenden plettorischen Zustande sich befinden, ein nicht unbedeutendes Contingent zur Herzhypertrophie stellen.

Eine Ursache für Herzhypertrophie ist auch gegeben in dem Mechanismus des Herzens, in der Veränderung der Arterienwände und in den Störungen des peripheren Kreislaufes. Die Klappen haben die Aufgabe, dem Blute eine bestimmte Richtung zu geben und für eine gleichmäßige Vertheilung desselben zu sorgen. Deshalb machen alle Klappenfehler, Insufficienzen und Stenosen oder wie William sie nennt: pegurgidirende sowohl wie obstuirende ihre nächste Rückwirkung geltend auf das Herz und betrifft die Blutvertheilung in demselben, die Weite seiner Höhlen und Dicke seiner Wandungen. Was die Veränderung an den Gefäßwänden betrifft, so erleiden dieselben eine solche durch den Atheromatösen Proceß oder wie Gull und Sutton den Vorgang nennen: durch die Arterio-capillary fibrosis. Der Reibungswiderstand, den das Blut dabei zu überwinden hat, ist ein größerer geworden, die Strecke der atheromatös entarteten Gefäßbahn hat eine größere Triebkraft nöthig, was ausgeglichen werden muß durch Vermehrung der vis a tergo. Dasselbe ist der Fall

bei angeborener Enge des Aortenstammes und feiner Verzweigungen.

Um der Störungen im peripheren Kreislaufe als Ursache zu Herzhypertrophie Erwähnung zu thun, so entsteht eine Störung des peripheren Kreislaufes überall da, wo eine grössere Collateralbahn, welche Aorta und Venae cavae einerseits und Pulmonal Arterie und Pulmonalvenen anderseits verbinden, der Circulation des Blutes entzogen wird, wo ein Theil des Capillarsystems obliterirt — verödet. Diese Aenderung in den allgemeinen Bedingungen des Stromlaufes muß einen nachweisbaren Einfluß haben auf die GröÙe der Herzarbeit.

Eine letzte Ursache für Hypertrophie ist zu suchen in der Erkrankung des Herzmuskels und in den Textarveränderungen der Herzwände. Bei Myocarditis muß der Blutdruck, während der Muskel krank ist und in Folge dessen das Blut nicht mehr mit der gehörigen Energie hinauswerfen kann, die Herzhöhle erweitern. Wenn nun die Entzündung rückgängig geworden, so hat der Muskel eine neue Höhle und er muß sich anstrengen, diese Höhle auszufüllen. Da aber mit der Erweiterung des linken Ventrikels nicht auch eine Erweiterung der Aorta eingetreten, so muß derselbe mit einer größeren Gewalt das Blut in die Aorta treiben. Es entsteht demnach excentrische Hypertrophie auf dem linken oder auf beiden Ventrikeln. Die Hypertrophie wird um so stärker sein, je weiter der Ventrikel und um so größer, je mehr die Aorta sich gleich geblieben. Ueber die fettige Degeneration als Ursache zu Herzhypertrophie kann nach Quain und Rokitsansky dieselbe zu Hypertrophie und Dilatation führen, ebenso wie Entzündung des Herzmuskels oder des Herzbeutels. Es sollen diese Zustände Lähmungen des Herzmuskels bewirken, in Folge welcher sich dann passive Erweiterung und Mus-

kelhypertrophie entwickelt. Auch Lebert¹⁰⁾ stimmt dieser Ansicht bei, wenn er in seinem Handbuche der praktischen Medizin sagt: „Die fettige Degeneration des Herzmuskels bewirkt Herzschwäche und unter immer mehr zunehmender Athemnoth gehen die Kranken zu Grunde. Nicht selten jedoch kommt es im Anfang und während einiger Zeit zu einer Art von krankhaftem Gleichgewicht. Dem Hinderniß entsprechend wird die nöthige, erhöhte Druckkraft durch vermehrte Ernährung und Hypertrophie erreicht.“

Es kann am Sectionstische auch gefunden werden, daß die äußere Schichte des Herzmuskels fettig degenerirt ist und die innere hypertrophisch; das ist der Fall bei Pericarditis. Wenn nach einer Entzündung des Herzbeutels das perietale und viscenale Blatt mit einander verwachsen, so werden, da das Herz bei seiner Action alle die adhären-ten Theile mitbewegen muss, seine Bewegungen verlangsam-
sam. Dabei wird die äußere Muskelschichte, da sie nicht mitarbeiten kann, fettig entarten, und die innere, da sie allein die Arbeit zu leisten hat, wird dem entsprechend hypertrophiren. (Buhl) Ich habe als Practicant der hie-
figen Poliklinik durch die Güte des Herrn Professor Dr. Seitz eine Patientin zugetheilt bekommen, die ich während 6 Monate behandelte. Es betraf eine 50 jährige Taglöh-
nerswittwe, die nach ihrer Angabe mit 20 Jahren die Blat-tern überstanden, einmal geboren hatte und mit 45 Jahren in das Klimacterium übergetreten war. Vor 2 Jahren er-
krankte sie an Husten, der von Zeit zu Zeit sich wieder besserte; nebenbei klagte sie über Appetitlosigkeit und Herzklopfen; über stechenden Schmerz an der linken Seite des Thorax, erschwertes Athmen besonders beim Reden

¹⁰⁾ Lebert, Handbuch der allgem. Pathologie und Therapie. Tü-
bingen 1865. pag. 99.

und konnte leichter in sitzender Stellung sprechen und freier athmen als liegend. Die unteren Extremitäten waren enorm hydropisch geschwellt. Wie ich das Erstmal zu ihr kam, war sie schon ein Jahr lang krank, ohne eine Ursache für ihr Leiden angeben zu können. Physicalisch fand man eine Verbreiterung der Herzdämpfung im Längs- und Breiten-Durchmesser, der Spitzenstofs stand in der axillarenlinie im 5. Intercostalraume. Die Herztöne erwiesen sich normal; auch an den Lungen waren keine matten und leeren Stellen zu finden. Die Percussion des Abdomens zeigte auf Flüssigkeit in demselben; in den untern Extremitäten Hydrapsanasarca.

Die Urinsekretion war spärlich, bei Druck in der Nierengegend verspürte Patientin Schmerz. Mitunter fand sich Eiweis im Urin, das aber bald wieder verschwand. Die Kranke kam immer mehr von Kräften; ihr Zustand verschlimmerte sich sehr durch die immer zunehmende Athemnoth und Beengung auf der Bruft. Gegen das Ende ihres Lebens stellte sich noch Hydrothorax ein, in Folge dessen der letale Ausgang eintrat. Bei der Section fand sich eine excentrische Hypertrophie des linken Ventrikels bedingt durch eine abgelaufene Pericarditis; das Herz war stellenweise mit dem Herzbeutel verwachsen; zwischen beiden hatten sich Schwielen gebildet. Die linke Lunge war frei, die rechte angewachsen an ihrer ganzen hinteren Fläche; in beiden Pleurahöhlen eine sehr erhebliche Quantität Serum. In den Nieren traten die Erscheinungen der Stauung zu Tage; sie waren hyperämisch, etwas vergrößert. An den übrigen Organen nichts abnormes. An beiden Tuben fand man eine abgelaufene Salpingitis mit Hydrops derselben. In der Peritonealhöhle eine mäßige Quantität Flüssigkeit.

Unter all' den angeführten, urfächlichen Momenten der Herzhypertrophie, sind es wohl die Klappenfehler,

welche die größte Zahl der Herzvergrößerungen bedingen. Doch sind auch nach Angabe einzelner Autoren die reinen Herzhypertrophien ohne Klappenfehler gar nicht selten. William Stokes¹¹⁾ erwähnt in seinem Werke „die Krankheiten des Herzens“:

So häufig dieser Zustand (der Herzhypertrophie) bei Stenose oder Insufficienz der Klappen vorkommt, so äußerst selten ist er in seiner einfachen Form, ja in einem Elementarwerke über praktische Medizin kann man diese Affection füglich ganz übergehen, denn in den meisten Fällen von Erweiterung und Verdickung des Herzens hat man zu gleicher Zeit ein Klappenleiden an der Mitralis oder semilunaris Aortae oder an beiden zugleich.“ Watson glaubt, daß Hypertrophie des Herzens unter 20 Fällen wohl 19 Mal die Folge eines Circulationshindernisses sei. Piorry gibt sich der Meinung hin, daß Herzhypertrophie immer durch ein Circulationshinderniß bedingt sei, ohne jedoch dieses Hinderniß immer in Klappenfehlern zu suchen. Er nimmt vielmehr Verwachsungen des Herzens mit dem Herzbeutel relativ zu enge Arterien, Contraction der Arterien durch Kälte als Ursache des Circulationshindernisses an. Bamberger erwähnt in seinem Lehrbuche der Herzkrankheiten, daß die Hauptursache der Herzhypertrophie wohl in mechanischen Ursachen von Circulationshindernissen liege, die ihren Sitz an den Klappen und Mündungen des Herzens, in den größeren Gefäßstämmen oder in der capillaren Ausbreitung derselben haben.

Nach W. Baur¹²⁾ dagegen, der im Jahre 1860 in Gießen 18 Fälle von reiner Herzhypertrophie beobachtet hat,

¹¹⁾ W. Stokes; die Krankheiten des Herzens aus dem Englischen übersetzt von Lindwurm. Würzburg 1855. Seite 255.

¹²⁾ W. Baur, über reine Hypertrophie des Herzens ohne Klappenfehler. Gießen 1860. pag. 36.

ist dieselbe keine seltene Krankheit. Als Urfachen hiezu gibt er an: eine gewisse Erregbarkeit des Nervensystems, durch welche die Herzaction gesteigert werde; die gesteigerte Erregbarkeit führe an und für sich schon zu Hypertrophie ohne ein mechanisches Hinderniß im Circulationssystem. Diese Ansicht begründet er damit, daß er sagt: es lehrt doch die tägliche Erfahrung, daß gesteigerte Muskelthätigkeit eine Vermehrung des Muskelgewebes zur Folge habe. Diese gesteigerte Erregbarkeit werde begünstigt durch Anämie, Chlorose, Hysterie, dauernden Genuß von zu starkem Cafe, Thee, abusus in alcoholicis. — Als objective Symptome führt er an: eine verstärkte Wölbung der Praecordialgegend, ferner den Herzimpuls, derselbe wird bei der Hypertrophie an einer ungewöhnlichen Stelle gefunden. Die Ausbreitung des Herzimpulses, die normaler Weise in Einem, selten in zwei Intercosträumen zu fühlen ist, wird bei der Hypertrophie abgesehen von der Verstärkung seiner Beschaffenheit, in zwei oder mehreren Interstitien wahrgenommen und zwar in einer Ausbreitung, wie sie unter normalen Verhältnissen nicht vorkommt. Die Percussion ergibt ein an den linken Sterealrand liegendes Dreieck oder unregelmäßiges Viereck; die Herzdämpfung wird durch linksseitige Hypertrophie länger, durch rechtsseitige breiter; bei totaler Hypertrophie sowohl in der Richtung von links nach rechts als von oben nach unten vergrößert, also gleichzeitig breiter und länger. Bei der Auscultation werden die Töne im Allgemeinen stärker und lauter gehört und in einer größeren Ausdehnung wahrgenommen. Der systolische Ton wird durch die verstärkten Vibrationen der mitralis und tricuspidalis, der 2. Ton durch die mit vermehrter Gewalt auf die semilunarklappe zurückwirkende Blutwelle verstärkt. Der Puls bietet keine zu verwerthende Erscheinungen. Diese von W. Baur angeführten Symptome liefs man aber nicht als charakteristisch

und richtig für reine Herzhypertrophie gelten, und damit wurde auch die Diagnose der beobachteten Fälle in Zweifel gesetzt. So gibt Stabsarzt Fraentzel¹³⁾ eine Epicrise in Virchow's Archiv ab, indem er sagt: „ich würde eine Verschiebung des Spitzenstoffes nach ausen nur für ein Zeichen der Ventrikeldilatation ansehen, welche ja mit Hypertrophie nicht nothwendig Hand in Hand zu gehen braucht. Dann ist eine auffallende Ausdehnung des Herzimpulses durchaus nicht ein Zeichen der Hypertrophie des linken Ventrikels, falls unter dem Herzimpuls der Spitzenstoß verstanden werden soll; denn dieses Symptom fehlt constant wenn die Hypertrophie Folge einer Nierenkrankheit oder Arteriosclerose ist, sobald nicht gleichzeitig eine Insufficienz der Aortaklappen besteht; anderseits sehen wir dasselbe ohne Hypertrophie des linken Ventrikels bei fiebernden Kranken und bei Individuen mit abnormer Erregbarkeit des vasomotorischen Nervensystems auftreten. Endlich kann ich nicht als richtig anerkennen, daß die Herztöne bei Herzhypertrophien stärker sind und der systolische Ton ein eigenthümliches klirrendes Timbre bekommt. Das wichtigste Symptom einer Hypertrophie des linken Ventrikels, um welches es sich in den beschriebenen Fällen gehandelt hat, die dauernde Verstärkung des 2. Aortentons hat Baur gar nicht erwähnt. Ohne eine derartige Verstärkung des 2. Aortentons resp. des 2. Pulmonaltons zu constatiren, ist man meiner Ansicht nach nicht berechtigt, eine Hypertrophie des linken, resp. des rechten Ventrikels zu diagnosticiren.“ Nach den Erfahrungen von Traube gelten als Urfachen für idiopathische Herzhypertrophien: abusus spirituosorum namentlich bei gleichzeitigen starken Muskelanstrengungen, das übermäßige Tabakrauchen und

¹³⁾ Ueber die excentrische Herzhypertrophie durch Kriegsstrapazen. Virchow's Archiv. Band 57. pag. 215—228.

Störungen im Pfortaderfsystem. Diefc Hypertrophien find ziemlich regelmäfsig mit mehr oder weniger ftarker Dilatation der Ventrikel verbunden. Van der Byl beobachtete in der englifchen Armee unter 70 Fällen von Herzhypertrophie 8 mit vollkommen gefunden Klappen. Maclean¹⁴⁾ macht auf die Häufigkeit von Herzfehlern mit und ohne Klappenfehler bei dem englifchen Militär, im Vergleich zur civilen Bevölkerung aufmerkfam und betont befonders den Umftand, dafs die gewöhnliche Anamnefe ein Gelenkrheumatismus oft fehle. Auch Stabsarzt Thurn hat eine gröfsere Anzahl von Herzleiden und befonders nicht complicirte Herzhypertrophien beobachtet, die fich allmählich entwickelten, nachdem längere Zeit Herzklopfen vorangegangen war, und die mit rheumatifchen Befchwerden in keinem Zusammenhange ftanden.

Stabsarzt Frentzel hat nach dem Feldzuge von 1870—71 15 Fälle von dilatativer Herzhypertrophie beobachtet, von denen er behauptet, es beftand keine Erkrankung am Klappenapparat, welche zu Infuffizienz der Klappen oder zur Sterofe des betreffenden Oftiums geführt hätte und damit die Dilatation resp. die Hypertrophie des vor der Klappe gelegenen Ventrikels rechtfertigte. Es beftand keine chronifche Erkrankung des Respirationsapparates, um die Erfcheinungen des rechten Herzens zu erklären, keine Nierenerkrankung, keine Veränderung der Arterien, welche die Dilatation des linken Ventrikels mit oder ohne Hypertrophie natürlich erfcheinen laffen dürfe.“

Wie aber der Herzmuskel rein hypertrophiren kann, fo können feine Höhlen auch nur einfach dilatirt werden, ohne dafs eine compenfatorifche Hypertrophie nachfolgt. Diefc Art von Herzerkrankung findet fich bei anämifchen, mufkelschwachen Individuen mit erhöhter Reizbarkeit des Nervenfsystems.

¹⁴⁾ brit. med. Journal vom 16. Febr. 1867.

Diese Reizbarkeit ist entweder vorübergehend in Folge psychischer Affecte oder dauernd vorhanden durch unzweckmäßige Ernährung und Störung in der Blutbildung. Kommt für solche Individuen eine ungewohnte übermäßige Anstrengung von längerer Dauer, so wird theils in Folge der allgemeinen Muskelschwäche theils in Folge der Nervosität eine frühzeitige Ermüdung des Herzmuskels sich einstellen. Der ermüdete Muskel ist aber dehnbarer als in der Norm und der nachweisbare Ausdruck der Ermüdung des Herzmuskels in Folge seiner übermäßigen Anstrengung ist die Dilatation seiner Höhlen. Vier solche Fälle von einfacher Dilatation der Herzhöhlen sind verzeichnet in Virchow's Archiv im 57. Bande und darin wird diese Form der Herzerkrankung folgendermassen gedeutet: „Entweder ist schon von vornherein die Erweiterung des Ventrikels, sei es, weil die Drucksteigerung gleich sehr bedeutend oder die Musculatur sehr wenig resistent war, so groß geworden, daß späterhin eine Compensation der Ventrikelwand unmöglich wurde, oder der allgemeine Ernährungszustand der betreffenden Individuen blieb dauernd so schlecht, daß die Musculatur nicht hypertrophisch werden konnte.“

Diese 4 Kranken mit einfacher Dilatation des einen oder des anderen Ventrikels befanden sich übler, als diejenigen, bei welchen eine gleichartige Hypertrophie bestand. Sie waren viel kurzathmiger, deutlich cyanotisch und viel weniger arbeitsfähig.

Eine einfache Dilatation der Herzhöhlen bei muskelschwachen und nervösen Personen wird eine bleibende und eine compensatorische Hypertrophie der Wandungen folgt nicht nach. Zwar wird auch ein gesundes Herz dilatirt, aber es kann den Widerstand länger überwinden. Eine verstärkte Herzaction wird durch erhöhte Druckkraft den

Widerstand auszugleichen suchen, dadurch, daß der dilatirte Ventrikel hypertrophirt.

Nach Friedreich kommen atonische erelaxative Dilatationen vor durch Verminderung des vitalen Tones, durch eine Art von Erschlaffung und Schwäche der Herzsubstanz oder durch einen in Folge feinster, molecülärer und unsichtbarer Ernährungsstörungen bedingten Zustand von Erweichung und Cohäsionsverminderung des Herzfleisches. Man habe diese Form nachgewiesen mitunter in Begleitung chronischer, constitutioneller Erkrankungen, z. B. Chlorose besonders im Verlaufe schwerer puerperaler, pyämischer namentlich typhöser Fieberzustände, vorzugsweise bei den in Irland vorkommenden typhösen Fiebern. Daß ein dilatirter linker Ventrikel, dessen Muskelwände in seiner contractilen Kraft geschwächt sind, eine vollständige Aufeinanderpassung der Ränder der Mitralklappen behindert und eine Insufficienz derselben bedingt, ist leicht erkennbar.

Diese Thatfache, daß Dilatation des linken Ventrikels auch Fehler an der Mitralis bedinge, hat Peacock¹⁵⁾ bei den Arbeitern in den tiefen Kupfer und Zinnminen von Cornwallis beobachtet und sucht sie folgendermassen zu deuten: „Die Männer in diesen Bergwerken sind Herzaffectionen sehr häufig unterworfen, welche im Allgemeinen die Form von Mitralinufficienz annehmen. Diese Insufficienz denkt er sich als höchst wahrscheinlich abhängig von einer Erweiterung des linken Ventrikels. Peacock führt dieses genauer aus: Eingang und Ausgang aus den Minen geschieht in den verticalen Schachten. Die Arbeit besteht mit schwerem Hammer auf den Bohrer zu klopfen. Die Luft ist sehr schlecht, arm an Sauerstoff, reich an Kohlensäure und den Verbrennungsproducten des Pulvers, der Lampen und der Athemluft der Arbeiter. Eine Abtheil-

¹⁵⁾ On some of the causes et effects of vabular disease of the heret.

ung arbeitet je acht Stunden lang. Auf dem Heimwege müssen die Arbeiter oft eine Stunde und mehr Leitern steigen und kommen an der Oberfläche an außer Athem und mit Herzklopfen. Mit dem 40. Jahr beginnen sie an den Athembeschwerden und Palpitationen zu leiden und in 5 oder 10 Jahren von da an sind sie meistens mit wenigen Ausnahmen gezwungen, die Arbeit unter der Erde aufzugeben. Die Dauer der Arbeitsfähigkeit war im Mittel 28 Jahre in den Extremen 5 und 53 Jahre. Sie leiden dann gewöhnlich an den Erscheinungen der bronchitis chronica Emphysem und bieten häufig auch Zeichen von Dilatation des Herzens und Insufficienz der Mitralis. Der Herzfehler wird herrühren hauptsächlich von der Ausdehnung und Ueberanstrengung des Herzens bei dem anhaltenden und ermüdenden Klimmen. Die Folge davon muß eine Stauung in der Respiration sein und so eine Hemmung des freien Durchtrittes des Blutes in die Lungen. Die rechte Seite des Herzens wird überfüllt werden und das Venensystem im Allgemeinen congestionirt, und da der Strom des Blutes durch die Arterien auch gehemmt ist, wird der linke Ventrikel ausgedehnt werden und gereizt bis zur Ueberarbeitung. Indem so die Höhlen für gewöhnlich überladen bleiben, müssen die Muskelwände beständig in ihrer contractilen Kraft geschwächt und erweitert werden. Die Dilatation des linken Ventrikels wird die vollständige Aufeinanderpaßung der Ränder der Mitralklappe verhindern.

Noch eine Art von Dilatation des Herzens möchte ich erwähnen, die aber eine normale zu sein scheint. Es ist das die Dilatation des Herzens im Greisenalter. So sagt Geist¹⁶⁾ in seiner Klinik der Greisenkrankheiten: „Das Herz nimmt im hohen Alter in allen seinen Dimensionen

¹⁶⁾ Geist, Klinik der Greisenkrankheiten, Erlangen 1860. (pag. 187—193.)

zu; daher wird es länger, breiter und dicker. Allein diese Dimensionsverschiedenheiten sind so überwiegend durch die Altersmasse des linken Ventrikels bestimmt, daß der rechte Ventrikel entweder nicht oder nur unverhältnißmäßig an diesen Dimensionsveränderungen participirt. Diese Masse, — obschon sie sehr wesentliche Abweichungen von dem physiologischen Zustande des Herzens im mittleren Lebensalter repräsentiren — fallen vollständig in ihre allmähliche Entwicklung als pathologisch physiologische Zustände in das Bereich der Gesundheitsbreitegrade der Jahrzehnte des hohen Alters.“

Nachdem ich bis jetzt die Umstände auseinandergesetzt habe, unter denen bloß reine Hypertrophie des Herzmuskels und einfache Dilatation seiner Höhlen auftritt, möchte ich im Folgenden zeigen, unter welchen Bedingungen excentrische Hypertrophie des einen oder des anderen Ventrikels oder beider zugleich wahrzunehmen ist.

Wenn ich mit dem rechten Ventrikel beginne, so ist eine physiologische Hypertrophie desselben gegeben während der Zeit des intrauterinen Lebens, in welcher das rechte und linke Herz sich in die Arbeit des großen Kreislaufes gemeinschaftlich theilen und der kleine erst angedeutet ist. In dieser Zeit füllen sich beide Ventrikel mit offenem foramen ovale von den Hohlvenen aus unter gleichem Druck. Diese Hypertrophie des rechten Ventrikels wird auch nach der Geburt noch fortbestehen, wenn durch Lücken im Septum oder durch Offenbleiben des foramen ovale Communicationen zwischen beiden Herzhälften bestehen. Füllen sich ja auch dann noch beide Ventrikel unter gleichem Druck und erhalten sich in ihrer Massenzunahme gleich, während in der Norm der rechte Ventrikel durch die Schließung der Klappen des eirunden Loches und schwächere Füllung mit Blut, an Masse abnehmen soll. Persistirt eine Hypertrophie des rechten Ventrikels auch nach der Geburt noch

fort, so stellt diese die höchsten Grade der Hypertrophie dar, die den rechten Ventrikel treffen kann.

Hypertrophirt er erst extrauterin, so ist fast immer die Dilatation bedeutender als die Hypertrophie. Extrauterin wird der rechte Ventrikel hypertrophisch bei Behinderung des Lungenkreislaufes durch Compression der Lungen. Dieses geschieht durch Rückgratsverkrümmungen namentlich bei Scoliose; ferner durch hydrops pericardii, treurysmen der Aorta und Neoplasmen im Thorax, endlich durch den Druck großer pleuritischer Exsudate. Vom Bauchraum aus betrifft die Compression wohl nur die untersten Parthien der Lunge. Der Pulmonalkreislauf wird ferner behindert bei verschiedenen Formen des Emphysems. Beim serilen Emphysem beruhend auf Schwund der Capillaren strömt das Blut rückwärts in die Pulmonalarterie und der rechte Ventrikel wird erweitert. Ebenso ist beim mechanischen Emphysem, beruhend auf chronischen bronchitis ein Hindernis für den Durchtritt des Blutes vom rechten Herzen aus vorhanden, daher: excentrische Hypertrophie desselben. Bei der käsigen Pneumonie, während deren Verlauf die Alveolen, Berectiolen und Gefäße obliteriren, kann zwar durch Rückstauung des Blutes in die Pulmonalarterie und durch erhöhten Druck in derselben excentrische Hypertrophie des rechten Ventrikels mit Erweiterung des Vorhofes eintreten, aber wegen des allgemeinen Marasmus und der Verminderung der Gesamtblutmenge wird diese Erscheinung doch selten zu Stande kommen. Eine Hypertrophie des rechten Ventrikels bedingen auch die Fehler an der Mitralis und die Stenose der Pulmonalklappe und Insufficienz der Tricuspidalis, sowie Verengerung des Conus arteriosus am rechten Herzen.

Erweiterung und Vergrößerung des rechten Herzens ist die Folge einer länger dauernden, excessiven Anforder-

ung an die Verbrennung bei ungenügender Zufuhr von Nahrungsmitteln, sowie die Folge einer im Verhältniß zum Körpergewicht mangelhaften Lungenausdehnung. Dabei wird eine Kraft gesucht, die nothwendig wäre zur Herzarbeit, die aber nicht oder nur mangelhaft vorhanden ist, weil auch die Bedingungen der Verbrennung, Sauerstoff und organischer Nahrungstoff nur mangelhaft zugeführt werden. In Folge davon wird das Blut wieder zum rechten Herzen zurückgeschickt, um wieder eine Triebkraft von daher zu suchen, aber umsonst. Ob dabei das Herz allein dilatirt wird, oder ob die Vergrößerung ganz oder theilweise in Wandverdickung bestehe, ob dieser Vorgang sich auf eine oder beide Kammern erstreckt, hängt von verschiedenen Umständen ab. Ist das überangestrengte Herz ein schwaches, so finden wir die Ausweitung beider Kammern. Auch wenn der Kranke zwar kräftig gebaut, aber durch Sorglosigkeit oder Armuth einer gehörigen Nahrung entbehrt, finden wir das Gleiche. Wenn die Lungen klein sind, finden wir besonders Ausweitung des rechten Herzens. Ueberdies trifft dasselbe in Fällen zu, wo die Lungen, ob schon von entsprechender Gröfse, in ihren Bewegungen gehemmt sind, wie bei Athleten, welche um die Brustenge Kleider tragen, oder bei Arbeitern, deren Beschäftigung im Lastenheben und anderen Arbeiten bestehen, bei denen die Wände der Brust fixirt und ihre volle Ausdehnung gehindert wird. Wenn aber unter den Einflüssen der Ueberanstrengung die Personen wohl gebaut und wohl genährt sind, wenn die Lungen die nöthige Gröfse besitzen, freie Bahn haben und sich in reiner Atmosphäre ausdehnen können, da werden wir auch eine Vergrößerung finden, vielleicht an beiden Ventrikeln, aber nicht blofs eine Dilatation sondern eine solche Hypertrophie, wo die Wandverdickung im Verhältniß steht zur Ausweitung.

Eine letzte und gewifs sehr seltene Ursache der ex-

centrifchen Hypertrophie des rechten Ventrikels ist zu suchen in der fettigen Degeneration des linken.

Ich hatte während der Winterdemonstrationen des Herrn Prof. v. Buhl im vorigen Jahre Gelegenheit, einen derartigen Fall zu sehen. Es betraf eine Herzhypertrophie mit nachträglicher Fettdegeneration und Muskatnufsleber. Das vorgelegte Herz fand sich bei der Obduction eines 46 Jahre alten, grossen, sehr kräftigen und fettreichen Mannes, der bei Lebzeiten den Spirituosis stark gehuldt hatte und unter den Erscheinungen des allgemeinen Hydrops zu Grunde ging. Die Cyanose machte sich am Gesichte, an den Nagelgliedern der Finger und Zehen bemerkbar. Das Herz war nach allen Durchmessern namentlich aber in der Breite vergrössert, hatte seine sonst mehr conische Gestalt eingebüsst und eine kugelhähnliche von vorn nach hinten platt gedruckte Form angenommen.

Namentlich der rechte Ventrikel zeigte eine Vergrösserung, indem nicht nur seine Höhle dilatirt war, sondern auch seine Wandverdickung derartig an Maasse zugenommen hatte, dafs sie beinahe dem dicken Durchmesser des linken Herzabschnittes gleichkam. Eine solche Dilatation mit Hypertrophie des rechten Herzens hat man sonst in der Regel nur bei mechanischen Circulationshindernissen an der Klappe z. B. Stenose der mitralis zu treffen, wo der normale Tonus des rechten Ventrikels in Folge der Blutflauung im venösen Kreisläufe überwunden wird und die Herzhöhle sich erweitert. Die dauernde Blutüberfüllung bedingt einen erhöhten Kraftaufwand der Muskelfasern. Die vermehrte Thätigkeit aber führt eine lebhaftere Blutzufuhr, gesteigerte Ernährung und somit Massenzunahme: Hypertrophie herbei.

An dem erwähnten Herzen konnte aber keine derartige Erkrankung der bicuspidalis nachgewiesen werden. Das ostium venosum sinistrum ist weder verengt ge-

wesen, noch eine Insufficienz der Klappen gegeben. Auch die Aortenklappen sind functionsfähig. Man könnte etwa denken, daß wie bei Insufficienz der Aortaklappen der linke Ventrikel hypertrophisch wird, die vorliegende Hypertrophie des rechten Herzens durch eine Stenose der Pulmonalklappen veranlaßt worden sei; doch konnten auch in diesen keine Strukturveränderungen nachgewiesen werden. Es fragt sich nun, wie dann die rechtsseitige Herzhypertrophie zu Stande kam, auf welche urfächliche Momente sie zurückzuführen sei?

Die mikroskopische Untersuchung des Herzmuskels gab darüber den gewünschten Aufschluß. Während nemlich der rechte Ventrikel in seiner Musculatur wirkliche Vergrößerung und Vermehrung der Muskelfasern ohne erwähnenswerthe Degeneration zeigte, befanden sich die Muskelbündel des linken Herzens, dessen Papillarmuskel schon makroskopisch sich schwächer, dünn und platt gedrückt sich repräsentirten, in ausgesprochener fettiger Entartung.

Es ist klar, daß in Folge dieser Degeneration des Muskels eine Abschwächung der Herzkraft entstand, wie anderseits die schwachen Papillarmuskeln zu einer unvollkommenen Anspannung der Klappenfegel des linken Ostium venosum führten. Damit war eine sogenannte musculäre Insufficienz des linken Ventrikels gegeben, die eine venöse Stauung und wie bei Stenose der bicuspidalis Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels zur Folge hatte. — Die venöse Stauung machte sich in allen Organen geltend, war aber am ausgesprochensten in der Leber, die eine exquisite Muskatnussfarbe zeigte.

Wenn jeder Muskel entsprechend der Arbeit, die er zu leisten hat, an Masse zunimmt und sich so der Arbeit accomodirt, so wächst auch das Herz in toto im gleichen oder nahezu gleichen Schritte der auf dasselbe einwirkenden,

ausdehnenden Gewalt. Aber da unter dem Einflusse der übermäßigen Anstrengung vor Allem der Blutdruck im großen Kreisläufe erhöht wird, so wird es auch der linke Ventrikel sein, der zuerst in der Weite seiner Höhlen und Dicke seiner Wandungen zunimmt. Da ferner in der Regel nur kräftige Personen sich mit schweren Arbeiten abgeben, so werden wohl am meisten die Männer dieser Herzaffectio ausgesetzt sein. Je strenger die Arbeit, um so mehr Widerstand ist vorhanden wider den Blutabfluß gegen die Peripherie hin und um so mehr Neigung zur Ansammlung des Blutes im linken Herzen. Der linke Ventrikel kann dem nur begegnen durch Wachsthum und Zunahme seiner Muskulatur. Die Umstände, unter denen dieses geschieht, sind gelegen in Hindernissen, welche die Fortbewegung des arteriellen Blutstromes erschweren. Solche Hindernisse können liegen im Herzen selber, im Arterien-system, endlich in der Capillarität. Was das Herz selber als Ursache der Vergrößerung seines linken Ventrikels betrifft, so sind es die Peri- und Myocarditis, die, wie schon weiter oben erwähnt, in ihren Ausgängen fettige Degeneration und Hypertrophie des Herzmuskels zurücklassen; ferner die Fehler der Semilunarklappen der Aorta, oft auch die Insufficienz der Mitralis, wobei aber die Insufficienz nicht den hohen Grad erreicht, wie bei den Fehlern der Aortaklappen; dann Verengerungen des Conus arteriosus am linken Herzen und eine abnorme Communication beider Ventrikel. Unter den Hindernissen im arteriellen Gebiet sind zu erwähnen, die Veränderungen der Arterienwände durch den atheromatösen Proceß d. h. durch die im Anfang bestehende Rigidität, Verengung des lumens durch Auflagerung und spätere Erweiterung der großen Stämme. In der Gefäßstrecke, in der der Proceß vor sich geht, wird der Blutdruck einen größeren Widerstand erfahren; um ihn zu überwinden, ist eine größere Triebkraft erforderlich und die

ungünstigen Circulationsbedingungen müssen ausgeglichen werden durch compensatorische Hypertrophie des linken Ventrikels. Durch das Atherom verlieren die Arterienwände die Eigenschaft der Elastizität, welche nothwendig ist zur Unterhaltung einer regelmässigen Strömung in den peripheren Bezirken des Kreislaufes. Diese Eigenschaft der Elasticität büsst nach Cliffond Albutt¹⁷⁾ auch die gesunde Aorta ein bei längerer, übermässiger Anstrengung des Herzens.

Der Verlust dieser Eigenschaft bedingt Insufficienz der Aortaklappen und Hypertrophie des Herzens. Die Widerstandskraft der Aorta, sagt der angeführte Autor, ist gross aber ihre active Leistungsfähigkeit ist gleich Null oder genauer: sie ist nichts weiter, als das Zurückschnellen der elastischen Fafer. Gewaltfame Einflüsse auf derartige Membranen, weit entfernt, Kraftgewinn zu bringen, führen zu Einbussen an Elasticität, zu Schwäche. Und gerade in den Herzen, welche einmal einer übermässigen Anstrengung ausgesetzt sind, ist die Aorta im Beginne, ihre Elasticitätskraft zu verlieren, sich auszuweiten. Die inneren Membranen solcher Aortalarterien zeigten bei sorgfältiger Untersuchung in zwei von ihm beobachteten Fällen viele endarteritische Stellen und ein gutes Theil diffuse, granuläre Exfudation zwischen die Fafern der mittleren Gefässhaut. Von dieser Stufe aus ist die Ausbauchung der Aorta mit folgender oder gleichzeitig einhergehender Insufficienz der Klappen baldigst erreicht. Die Anhäufung von Blut in der Aorta treibt das Gefäss auseinander und das Herz wird durch dieses auf ihm lastende Gewicht zur Hypertrophie gebracht.

Um der Hindernisse für die Fortbewegung des Blutes im capillaren Gebiete Erwähnung zu thun, so nimmt die

¹⁷⁾ Lectures der pract. Medicin zu London. Aus dem 5. Band der St. George's Hospital-Reports, London 1872.

Obliteration der Gefäßbahn in den Nieren die hervorragende Stelle ein. Die Nierenerkrankungen, die eine Verödung der capillaren Gefäße veranlassen und deren Verlaufe Herzhypertrophie folgt, sind die hydronephrose mit consecutivem Schwund des Nierengewebes und die Schrumpfniere. Bezüglich der letzteren Nierenerkrankung als Urfache zu linker Herzhypertrophie und bezüglich der Art wie sie zu Stande kommt, gehen die Ansichten der Autoren auseinander. Die Thatfache, daß fast constant Hypertrophie des linken Ventrikels aufträte, bei Schrumpfniere hatte zuerst Bright wahrgenommen. Er erklärte das Zustandekommen derselben durch einen Reiz, der auf den Herzmuskel ausgeübt werde durch verunreinigtes Blut, das durch die kranken Nieren die Auswurfstoffe nicht auszuscheiden vermöchte. Allein diese Deutung ist nicht stichhaltig. Es ist nemlich nicht nachgewiesen, ob das Blut bei Beginn der Herzhypertrophie wirklich verunreinigt sei; und wenn dieses wirklich der Fall wäre, so müßte der nemliche Reiz die gleiche Wirkung auch auf das rechte Herz haben. Ferner müßte bei Amyloid- und Fettnieren, wo das Blut ebenfalls durch Harnbestandtheile verunreinigt wird, ebenfalls eine Hypertrophie des linken Ventrikels folgen, die aber bei diesen Nierenerkrankungen ausbleibt. Frerichs glaubt, daß Herz- und Nierenleiden bedingt seien durch gemeinsame Schädlichkeiten: Erkältung und Abusus spirituosorum. Dickinson hatte 308 Fälle von granulärer Entartung der Niere zusammengestellt und nach seiner Berechnung treffen

zwischen 10 und 20 Jahre 1 Fall,

„ 20 „ 30 „ 24 Fälle,

„ 30 „ 40 „ 50 „

„ 40 „ 50 „ 93 „

„ 50 „ 60 „ 76 „

und zwischen 60 und 70 Jahren 47 Fälle.

Diese Thatfache spräche dafür, daß dieses Nierenleiden, wenn es auch nicht als eigentliche Alterskrankheit zu betrachten sei, doch sehr viel häufiger im höheren Alter als in jüngeren Jahren aufrete. Gull und Sutton hatten an 336 Leichen beliebiger Personen und aus verschiedenen Lebensaltern Untersuchungen vorgenommen, und knüpften daran eine Berechnung der Proportion, in welcher sich die Schrumpfniere auf die verschiedenen Lebensdecennien vertheile. Aus dieser Berechnung wurde als Schluß gefunden, daß diese Krankheit mit zunehmender Zahl der Lebensjahre in gleichem Verhältnisse angetroffen werde. Weil nun nach ihrer Erfahrung die größte Zahl dieser Erkrankung dem höheren Alter zukömmt, weil man ferner als ein Attribut des höheren Alters die Atheromatose bezeichnet und fast alle Fälle von granular Atrophie der Nieren mit dieser Erkrankung der Gefäße begleitet sind, so bezeichneten sie die Schrumpfnieren und die Hypertrophie des linken Ventrikels, als die Coeffecte des von ihnen behaupteten Allgemeinleidens, das sie Arterio-capillary-fibrosis nennen. Auch Johnson stimmte der Ansicht bei, daß durch die mangelhafte Secretionsthätigkeit der Nieren das Blut verunreinigt werde und eine Hypertrophie des Herzens bedinge, aber nicht in allen Fällen. In einzelnen Fällen von Nierenschrumpfung bleibe die Herzhypertrophie aus in Folge allgemeiner Ernährungsstörungen. Diese Deutung der Herzhypertrophie bei granulärer Entartung der Nieren theilt Barthels¹⁸⁾ nicht. Für's Erste ist er erstaunt über das ungeheure Material, welches den englischen Autoren zu Gebote stand und wundert sich, daß sie nicht angaben, woher sie es für ihre Untersuchung genommen. Dann glaubt er, daß die von ihnen herausgerechneten Verhältnissahlen den Schrumpfnieren nach Decennien keinen An-

¹⁸⁾ Krankheiten des Harnapparats, Leipzig 1875. pag. 370—430.

spruch auf allgemeine Giltigkeit haben können. Er glaubt überzeugt zu sein, daß eine über das ganze Arterien-system oder auf einen großen Theil desselben verbreitete Erkrankung der Gefäßhaute, wie die englischen Autoren sie annehmen, jedenfalls für einen Theil der mit Herzhypertrophie verbundenen Fälle von Nierenschrumpfung gar nicht zutrefte. Barthels ist der Ansicht, daß bei der wässerigen Beschaffenheit oder allgemeinen Verminderung der Blutmasse, weder eine Hypertrophie des Herzens zu Stande kommen kann, noch eine Dilatation entstehen muß. Ist das Blut wässriger als in der Norm, so wird es im Aortensystem zu einer abnorm hohen Spannung nicht kommen, weil die Flüssigkeit in die Leibeshöhlen und das Unterhautzellgewebe transsudirt. Bei allgemeiner Verminderung der Blutmasse kann ebenso wenig eine abnorm hohe Spannung zu Stande kommen und es muß also die Hypertrophie des linken Ventrikels ausbleiben, wenn auch beide Nieren atrophieren.

Traube erklärte die Hypertrophie des linken Ventrikels bei dieser Art der Nierenerkrankung durch eine Erhöhung des hamostatischen Druckes in der Aorta.

Er stellte den Satz auf, daß die Hypertrophie des linken Herzens eine Folge sei der erhöhten Spannung im Aortensystem, welche nothwendig eintreten müsse, sobald durch Obliteration einer größeren Anzahl von Arterienverzweigungen in den Nieren mit den Malpigh'schen Knäueln die Abzugskanäle für das Blut der Arterien eingeengt werden. Er stellte die Wirkung der Nierenschrumpfung und des linken Herzens in gleiche Linie mit der Wirkung, welche die Mitralfehler und gewisse Krankheiten der Lungen unbestritten auf die rechte Herzkammer ausüben. Diese Hypertrophie des linken Ventrikels ist nach ihm eine wirkfame Compensation für den Ausfall secreterischen Gewebes in den Nieren. Diese Theorie von Traube hat man

nicht für genügend gehalten als Erklärung der Hypertrophie des linken Ventrikels. Man hielt ihn namentlich entgegen, daß auch eine secretorische Leber denselben erhöhten Aorten Druck veranlassen würde wie eine granulirte Niere; ferner führt man gegen die Theorie von Traube an, daß man zuweilen eine exquisite Schrumpfniere ohne excentrische Hypertrophie des linken Ventrikels am Secirische finde. Nach physiologischer Beobachtung muß, wenn irgend eine größere Collateralbahn der Circulation des Blutes entzogen wird, diese Aenderung in den Bedingungen des Stromlaufes einen wesentlichen Einfluß auf die Herzarbeit haben. Der nachweisbare Einfluß der Obliteration ppherischer Gebiete auf das Herz bedingt Volumszunahme desselben. Von besonderem Einflusse auf diese Thatsache ist das Leitungsvermögen einer Strombahn. Es bestimmt wie den Widerstand des Systems so auch den Grad der in Folge ihrer Obturation eintretenden Herzhypertrophie. Ein Stromgebiet von enormer Füllung aber geringem Leitungsvermögen wie z. B. das System der Pfortader, ist für die Arbeit des Herzens viel weniger bestimmend als gut leitende Bahnen mit noch so geringem Blutgehalt. Dem entsprechend wird physiologisch nicht in ebendemselben Grade durch Lebercirrhose Hypertrophie des linken Ventrikels bedingt sein müssen, als sie bedingt ist bei granulärer Atrophie der Nieren.

Nach Obliteration der Capillaren in der Leber tritt die Galle in das Blut über, damit wird der ganze Organismus und folglich auch die Herzaction geschwächt; der Organismus aber kann noch fortexistiren, wenn die Galle dem Blut beigemischt ist. Ganz anders aber ist das Verhältniß bei der Schrumpfung der Nieren. Durch die Niere muß nach Untergang der Capillarität das Excret, welches hinaus geschafft werden soll, hinausgeprefst werden oder der Organismus kann, wenn die Niere nur kurze Zeit ihre Func-

tion einstellt, nicht länger mehr persistiren. Die Ausscheidung des Harns aber nach Obliteration der Capillarität kommt nur dadurch zu Stande, daß der Blutdruck ein größerer wird, damit muß aber auch die Triebkraft des Herzens eine größere werden und das läßt sich nachweisen, durch Volumszunahme desselben oder Hypertrophie. Bei Obliteration einer Strombahn in einem Organe ist demnach von wesentlichem Einfluß für die Arbeit des Herzens die Function des betreffenden Organs. Ich könnte noch Erwähnung thun der Zeit, innerhalb welcher Lebercirrhose und Schrumpfnieren verlaufen. Allein damit sich wenig für meinen Einwand gewinnen, denn innerhalb 1—3 Jahren, während welcher Zeit der Process der Lebercirrhose vor sich geht, wäre ebenso ein Zustandekommen der Herzhypertrophie möglich als während des Ablaufes der granulär Atrophie der Nieren, bis zu deren zu Stande kommen 20 Jahre vergehen können.

Wenn es nun aber doch Fälle gibt, wo bei Nierencirrhose Hypertrophie des linken Ventrikels ausbleibt, so müssen wir nach Dusch annehmen, daß die Nierenaffection sich noch nicht im Stadium der Schrumpfung befindet. In ausgesprochenen Fällen von Nierencirrhose mag auch die schon weit gediehene Cachexie und die schlechte Ernährung im Allgemeinen die Entwicklung der Herzhypertrophie verhindern.

Somit wäre ich am Ende meiner Aufgabe angelangt. Ich habe in derselben zu zeigen versucht, daß eine übermäßige Anstrengung des Herzens nothwendig zur Ueberreizung desselben führe; nach einer übermäßigen Anforderung an das Herz müsse seine Triebkraft nachlassen und es komme dann zu Stauungen in den verschiedenen Organen des Körpers. Unter ungünstigen Verhältnissen namentlich in hoher Athmosphäre wirke eine mächtig erregte Thätigkeit des Herzens störend auf die Function des centralen

Nervensystems und dadurch könne eine Lähmung der Muskel überhaupt somit auch eine Paralyse des Herzmuskels eintreten. Ich suchte dann darzuthun, daß wenn die schädlichen Momente länger auf das Herz einwirken, eine Ausweitung seiner Höhlen und Verdickung seiner Wandungen die nothwendige Folge sei. Ich habe dann hingewiesen auf die Umstände, unter denen eine reine Herzhypertrophie ohne Klappenfehler und die einfache Dilatation ohne comperatorische Hypertrophie zu Stande kämen. Im weiteren Verlaufe suchte ich die ätiologischen Momente anzuführen, die bloß das rechte und das linke Herz hypertrophisch machen.

Die wenigsten Formen der erwähnten Herzerkrankungen sind congenital, weitaus die häufigsten werden acquirirt und zwar schon in jüngeren Jahren. Im Allgemeinen sind es Leute von der arbeitenden Klasse, die mit diesen Herzfehlern behaftet sind, weil ja hauptsächlich sie schweren Arbeiten ausgesetzt sind und schlechte Nahrung und unreine Luft genießen. Weitaus das größte Contingent und relativ die meisten Todesfälle an Herzerkrankungen stellt das Militär. Nach den statistischen Sanitätsberichten für die norddeutsche Armee (Correspondenzblatt des niederrheinischen Vereins für Militär-Gesundheitspflege) kamen im Jahre 1867 auf 120,799 inneren Kranke 592 acute und chronische Krankheiten des Herzens und der inneren Gefäße; 1868 auf 152,234 ebenso 524; 1869 auf 148,491 531 oder respect. 0,49; 0,34; 0,35% Herzkranke.

In all' diesen drei Jahren gingen die meisten chronischen Herzleiden im Winter zu und nicht in heißen Sommertagen, so daß also die Zeit der Neueinübung der Recruten wohl ausschließlich die Epoche ist, während welcher chronische Herzleiden zur Beobachtung gelangen. C. Mailleau zählt unter 5500 inneren Kranken 492 Herzkranke oder 8,9%; bei Stabsarzt Thurn treffen unter seinen in-

neren Kranken 4⁰/₁₀ auf Herzleiden. Nur wenige dieser Leute schienen völlig gesund; die Meisten waren schlecht genährt, schwächlich und beschuldigten Exerciren, Turnen, Wäſche u. dgl. als die Urfache ihres Herzleidens. Die Herzhypertrophie erwähnt B. R. Myers wird, wenn sehr ausgesprochen und wie fast immer unabänderlich der Fall ist, von Dilatation begleitet, selbst eine anerkannte Krankheit und zwar eine, durch welche die Armee empfindliche Verluste erleidet. Er führt die Häufigkeit der Herzleiden beim Militär zurück auf die Form der Kleidung, die Menge und Anordnung der Ausrüstungsgegenstände. Im bürgerlichen Leben erwähnt er, werden bei Anstrengung alle hemmenden Kleidungsstücke entfernt; beim Soldaten müssen Brust und Hals eingeschnürt bleiben; enge Kleider, Watte-west, Bauchgürtel, Haberſack und ſeine Riemen arbeiten zuſammen, um den Thorax wie mit einer Schraube einzu-zwingen und hemmen die Circulation in Lungen, Herz und groſsen Gefäſſen. Befonders die Einſchnürung des Halses durch den Rockkragen wirkt ſehr ſchädlich und vermehrt durch Beſchränkung des Blutlaufs die Anſtrengung des Herzens. Der noch wenig verknöcherte Thorax eines 18 bis 20 jährigen Rekruten bietet nicht genug Widerſtand gegen den Druck der Kleidung; das verhältnißmäſſig zu ſchwache Herz wird durch dieſe Beengung immer mehr und mehr reizbar und aufgereggt. So iſt es nicht zu wundern, daſs an Feldtagen ſo viele Leute im Zuſtande höchſter Erſchöpfung aus dem Gliede fallen, und daſs die Aerzte verſichern, viele würden nur durch einen ſehr ausgeſprochenen eſprit du corps noch aufrecht erhalten. Ruhe und einige Zeit andauernde Spitalbehandlung können das Herzklopfen in gewiſſen Schranken halten; ſind dieſe Mittel aber erfolglos, ſo bleibt nichts anderes übrig, als den Mann als Invalide zu erklären, obſchon die Krankheit erſt eine functionelle iſt.

Im Gegenfatze zu diefer Thatfache, bemerkt Clifford Albatt, verhindert das gute Leben an der Univerfität und die Sorgfalt, welche die jungen Männer glücklicher Weife fich angedeihen laffen, Herzveränderungen und befähigt fie, die Leibesübungen mit all' ihren Vortheilen zu genießen. Alles das ift ein Beweis für die erfreuliche Thatfache, dafs gute Nahrung und verftändige Wachfamkeit, folchen Gefahren felbft in jungen Geweben vorbeugen kann.

Gute Nahrung, reine Luft, unbehinderte Ausdehnung der Lungen und Pflege der Leibesübungen werden wie jeden fo auch den Herzmuskel kräftigen und ihn vor jeder krankhaften Veränderung bewahren, deren Vorhandenfein irgendwelche Störung in feiner Function bedingen.



